

KIEDY JEST WSKAZANA IZOLACJA DZIECKA?

Izolowanie dziecka od matki to poważna decyzja, która niesie szereg niekorzystnych konsekwencji w sferze psychicznej i biologicznej. Biorąc pod uwagę z jednej strony ryzyko silnego stresu, depresji poporodowej, zaburzeń laktacji i żywienia dziecka, a z drugiej strony wartość immunologiczną mleka kobiecego, wagę więzi matka-dziecko, koszty izolacji prowadzonej w szpitalu i ryzyko zakażenia personelu, w większości krajów izolacja jest podejmowana tylko, gdy matka lub dziecko są objawowi, w ciężkim stanie ogólnym wymagającym intensywnego leczenia i hospitalizacji. Zawsze przeprowadza się rozmowę z matką i jej rodziną, aby wybrać najlepszy wariant dla obu stron odpowiednio do sytuacji kliniczno-epidemiologicznej i organizacyjnej danej rodziny.

Poniższa tabela może pomóc poruszać się po różnych wariantach sytuacji uwzględniając zarówno polskie jak i europejskie zalecenia. Podmiotem jest dziecko, od kogo powinno być izolowane lub nie, jak może być żywione, kiedy następuje zmiana sytuacji.

Zasady izolacji dziecko-matka-inni w okresie pandemii COVID-19			
Matka	Dziecko	Izolacja dziecka	Mleko matki
(?) zdrowa (-) wyzdrowiała	(?) zdrowe (-) wyzdrowiało	od matki NIE od innych domowników NIE od innych osób NIE	Karmienie piersią lub odciąganiem mlekiem z zachowaniem zasad Higieny podczas karmienia/odciągania
(?) zdrowa na kwarantannie	(?) zdrowe	od matki NIE od innych domowników NIE od innych osób TAK	Karmienie piersią lub odciąganiem mlekiem z zachowaniem zasad Podwyższonej Higieny podczas karmienia/odciągania
(+) bezobjawowa skąpoobjawowa	(?) zdrowe czeka na wynik testu	od matki NIE od innych domowników NIE od innych dzieci TAK od innych osób TAK	Karmienie piersią/odciąganiem mlekiem z zachowaniem zasad Podwyższonej Higieny podczas karmienia/odciągania
(+) bezobjawowa skąpoobjawowa	(+) bezobjawowe skąpoobjawowe	od matki NIE od innych dzieci TAK od innych osób TAK (ochrona osobista opiekuna/personelu) do czasu 2x (-) RNA-PCR-SARS CoV2 dziecka	Karmienie piersią/odciąganiem mlekiem z zachowaniem zasad Podwyższonej Higieny podczas karmienia/odciągania
	(+) chore		

(?) chora* czeka na wynik testu	(?) zdrowe czeka na wynik testu	od matki TAK od innych dzieci TAK od innych osób TAK (ochrona osobista opiekuna/personelu)	TAK, jeśli zastosowano zasady Pozyskiwania Mleka od Matek Podejrzanych lub Chorych w Domu/Szpitalu (reżim sanitarny) do czasu zakończenia izolacji
(+) chora	(-) zdrowe	od matki TAK od innych osób NIE od innych dzieci NIE - do czasu 2x (-) RNA-PCR-SARS CoV2 /w Polsce/ - do czasu wygaszenia objawów u matki /Europa/	TAK, jeśli zastosowano zasady Pozyskiwania Mleka od Matek Podejrzanych lub Chorych w Domu/Szpitalu (reżim sanitarny) do czasu zakończenia izolacji
(+) chora	(+) bezobjawowe skąpoobjawowe	od matki NIE od innych dzieci TAK od innych osób TAK (ochrona osobista opiekuna/personelu) do czasu 2x (-) RNA-PCR-SARS CoV2 dziecka	Karmienie piersią jeśli stan matki i dziecka pozwala Jeśli separacja wynika z hospitalizacji dziecka lub matki - odciągane mleko matki TAK z zachowaniem zasad Podwyższonej Higieny podczas odciążania
(+) chora	(+) chore	od matki TAK od innych dzieci TAK od innych osób TAK (ochrona osobista opiekuna/personelu) do czasu wygaszenia objawów dziecka	TAK, jeśli zastosowano zasady Pozyskiwania Mleka od Matek Podejrzanych lub Chorych w Domu/Szpitalu (reżim sanitarny) do czasu zakończenia izolacji
ZMIANA POSTĘPOWANIA następuje wraz ze zmianą stanu klinicznego lub w momencie uzyskania wyniku matki albo dziecka			

Legenda:

- (?) nie znany statusu, brak wskazań lub oczekiwanie na wynik testu RNA-PCR-SARS CoV2
 (+) wynik testu RNA-PCR-SARS CoV2 dodatni
 (-) wynik testu RNA-PCR-SARS CoV2 ujemny
 chora(e) = obecne objawy infekcji dróg oddechowych
 zdrowa(e) = brak objawów, nie znany status serologiczny